

В связи с появлением в различных интернет-источниках со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Республике Алтай информации «о вспышке чумы у животных на плато Укок», Роспотребнадзор разъясняет.

В информации, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 13 августа о заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии, в ходе которого рассмотрен вопрос о выполнении плана мероприятий по профилактике чумы в природном очаге в Кош-Агачском районе, нет каких-либо упоминаний о вспышке чумы среди животных.

В 2014-2016 годах в Кош-Агачском районе зарегистрированы единичные случаи заболевания чумой людей. Установлено, что среди сурков, охота на которых была широко распространена в районе, и мясо считалось у местного населения деликатесом, идет эпизоотия чумы. В связи с угрозой заболевания чумой людей, употребляющих сурков, принят комплекс мер по сокращению угрозы здоровью людей. В регионе в течение ряда лет реализуется Комплексный план мероприятий и Дорожная карта по профилактике чумы среди людей.

Ежегодно в апреле проводится вакцинация населения района против чумы. В 2020 году привиты против чумы 18090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе – 16500 человек.

Все гостиницы и турбазы, подразделения полиции, МЧС, ФСБ, комендатуры погранзастав, МАПП «Ташанта» и другие организованные коллективы обеспечиваются памятками и буклетами по профилактике чумы.

Ежегодно в Республике Алтай принимается Указ о запрете охоты на сурков, проводится системный контроль соблюдения запрета.

Роспотребнадзор осуществляет постоянный контроль ситуации в природном очаге. 07 августа 2020 года совместно с представителями управления сельского хозяйства администрации района и Комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира проведен очередной объезд животноводческих стоянок, цель которого - контроль соблюдения запрета охоты на сурка. Проведен объезд 20 животноводческих стоянок Казахского, Кокоринского и Ортолыкского сельского поселения в урочищах: Боро-Бургызы Бугуты, Киндикту-Кол. Фактов охоты на сурков не выявлено, проведены беседы по профилактике чумы, и розданы листовки, уведомления о недопустимости нахождения детей на стоянках.



БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» продолжает мониторинг за температурающими больными в Кош-Агачском районе. Не вакцинированных против чумы лиц не выявлено.

Сотрудники Алтайской противочумной станции в постоянном режиме проводят мониторинг территории природного очага, а также работы по предупреждению распространения инфекции.

18 августа в Кош-Агачский район для проведения исследовательских работ и профилактических мероприятий выезжает очередной эпидотряд в состав которого входят научные сотрудники противочумных институтов из Саратова и Иркутска. Работа эпидотряда продолжится до окончания сезона – до 15 сентября.

Эпизоотия чумы среди сусликов и монгольской пищухи в природном очаге в Кош-Агачском районе впервые была выявлена в июне 1961 г., в урочищах Уландрык и Сары-Гобо, в 8 км. от пос. Ташанта. Площадь эпизоотической территории равнялась нескольким десяткам гектар. С этого периода локальные эпизоотии среди мелких млекопитающих – носителей чумного микроба, регистрируются регулярно. В силу естественных причин (миграции носителей, разнос заражённых блох птицами и наземными хищниками и др.) отмечается расширение эпизоотии. В 1965 г. её площадь составляла уже 30 тысяч га. В связи с этим, в 1966 году по всей неблагополучной

территории начали проводить масштабное истребление носителей и переносчиков. В результате профилактических работ число выделяемых культур сократилось, но полностью оздоровить территорию очага не удалось. За два последних десятилетия, и особенно с 2012 года, когда в очаге впервые был выявлен высоковирулентный чумной микроб основного «античного» подвида, и что интересно, опять же в урочище Сары-Гобо, чума существенно расширила свою территории. До этого в Горно-Алтайском природном очаге выделялся чумной микроб «алтайского» подвида, отличающегося не высокой и избирательной вирулентностью. Он вызывал заболевания и падеж монгольской пищухи, но серые (алтайские) сурки были к нему практически резистентны. Основной подвид чумного микроба, поражает в первую очередь сурков и сусликов, вызывая их быструю гибель.

В 2020 года сотрудниками Алтайской противочумной станции выявлены чумные эпизоотии на 5 участках: окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средин Чуган-Узун; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Последние три участка расположены на плато Укок и выявлены впервые, за более чем 60-летний период наблюдения (с 1958 г.). Эта ситуация не может не тревожить, потому что здесь высокая численность носителей: серого сурка – на отдельных участках до 400 особей на кв. км; длиннохвостого суслика, даурской пищухи.

Плато Укок посещает большое количество туристов. Территория плато используется для зимнего выпаса скота животноводами с. Джазатор. На участке Акалаха расположена пограничная застава. Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний чумой, обеспечения эпидемического благополучия на территории Кош-Агачского района, в связи с обострением ситуации по чуме в соседней Монголии, 24 июля 2020 года главным государственным санитарным врачом Республики Алтай принято постановление № 6493

«
Об усилении мер профилактики чумы в природном очаге Кош-Агачского района Республики Алтай». Согласно требованиям постановления посещение эпизоотических территорий природного очага чумы, включая плато Укок, жителями и гостями региона, за исключением жителей с. Джазатор, использующих плато Укок для зимних выпасов животных, запрещено.