

Несмотря на то, что число пострадавших от присасывания клещей граждан еженедельно уменьшатся, за прошедшую неделю медики зарегистрировали всего 45 обращений по поводу присасывания клещей, о завершении сезона активности клещей (как ошибочно полагают многие жители и гости нашего региона) говорить ещё очень рано.

На 09.08.2021 в Республике Алтай с начала сезона пострадали от укусов клещей 4150 человек (из них 1388 детей до 14 лет). Заболели клещевыми инфекциями 92 человека. У 12 пациентов диагностирован клещевой энцефалит, у 18 человек - иксодовый клещевой боррелиоз, у 62 больных выявлен сибирский клещевой тиф.

С начала сезона проводится энтомологический мониторинг, в рамках которого исследовано 1597 экз. клещей, 751 из них оказались зараженными, то есть 47%, что говорит о высоком риске инфицирования клещевыми трансмиссивными инфекциями.

Именно во второй половине лета регистрируются тяжелые (и даже смертельные) случаи заболевания после присасывания клеща. Связано это с тем, что в течение сезона в клещах происходит накопление возбудителей. Многолетний анализ заболеваемости клещевым энцефалитом подтверждает выводы ученых – во второй половине июля и августе возрастает удельный вес тяжелых форм клещевого энцефалита.

С конца июня и до конца августа к людям могут присасываться нимфы (юная стадия развития клеща). Выглядит нимфа клеща, как взрослая особь, только раза в три меньше диаметром тельца (от 1 до 2 миллиметров) и часто люди не замечают этих маленьких паразитов! А ведь эти нимфы могут быть переносчиками немалого количества болезней, в частности клещевого риккетсиоза - самого распространенного заболевания в Республике Алтай. Заболевание сопровождается высокой температурой тела, первичным аффектом (корочкой) на месте укуса, сыпью. Все заболевшие – это те люди, которые после укусов клещей не обращались за медицинской помощью!

Чтобы предотвратить присасывание клещей необходимо:

- Ежедневно перед сном осматривать себя и своих детей (также живущих в

квартире кошечек и собак). При случае обнаружения клеща – **немедленно обращайтесь к медикам**

для введения иммуноглобулина и назначения профилактического лечения. Если у Вас нет возможности ввести иммуноглобулин после присасывания клеща, обратитесь к инфекционисту, он назначит лечение.

- Обрабатывать аэрозолями с пометкой «против клещей», особенно нижнюю часть гардероба – брюки и обувь (лучшие – **«ДЭТА», «Гардекс» и «Пикник»**, для детей рекомендуется:

«Бибан» и «Гардекс Бэби»

);

- Выбирать правильную одежду, отправляясь в места, где могут встречаться клещи. Идеальный вариант: иметь специальный костюм против клещей – «Биостоп»;

- Обрабатывать против клещей домашних и сельскохозяйственных животных. Есть специальные средства для животных, например, препарат «Бутокс-50» (Нидерланды). Препарат продается в ветеринарных аптеках в ампулах, в каждой ампуле – 1 мл. Разводится в дозе 1 мл на 1 л воды. Коров опрыскивают разведенным препаратом «Бутокс-50» через каждые 5-6 дней. Но есть одно но: «Бутокс-50» **не** рекомендуется для обработок

дойных

коров или коз (молоко нельзя употреблять 3 дня после обработки). Для обработки дойных животных можно попробовать экологически безопасный вариант: в опрыскиватель «Росинка» налить теплую воду, накапать туда 35 капель эфирного масла гвоздики, взболтать и опрыскать животное. Проверено - противоклещевой эффект держится 4-5 дней!

- Заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей – **через сырое молоко коз и коров**

(которых клещи кусают), поэтому в сезон клещевой активности (с марта по октябрь) нужно

кипятить

любое молоко!

Будьте здоровы!

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Единственный консультационный центр
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

**О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

- В лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках
- При заносе клещей собаками, кошками или людьми – на одежде, с цветами
- При употреблении в пищу сырого молока и продуктов, приготовленных из него
- При раздавливании клеща или расчесывании места укуса

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС

Голову и шею закрывают головным убором, лучше калашником

Используйте светлую одежду

Рукава должны быть длинными

Используйте отпугивающие средства – репелленты

Перед использованием репеллента ознакомьтесь с инструкцией

Завяжите рубашку в бок, концы бокс - в носки и сандалии

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Нельзя садиться или ложиться на траву

Внимательно осматривайте одежду и тело

Проверяйте животных после прогулки

Не заносите в помещение свежесорванные растения

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

ПО ВОЗМОЖНОСТИ СРАЗУ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИНЦЕТ
2. ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ МЕСТО УКУСА
3. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
4. ЕСЛИ ОСТАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ТОЧКА ОБРАБОТАЙТЕ 5% ЙОДОМ

Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию