

В настоящее время туберкулез является одной из актуальных проблем здравоохранения во всем мире, также и в Республике Алтай.

Туберкулёз – самое древнее из известных человечеству инфекционных заболеваний, вызываемое микобактериями туберкулёза, которые часто называют палочкой Коха.

Заражение происходит от больных, которые выделяют палочку туберкулеза в окружающую среду с мокротой при чихании, кашле, разговоре.

Основное место среди противотуберкулезных мероприятий у детей занимает специфическая профилактика туберкулеза с использованием БЦЖ-вакцины. Вакцина против туберкулеза была изготовлена еще в 1920 году ученым Женером, который смог создать ослабленную культуру бацилл Коха с помощью выращивания их в неблагоприятной среде. Эти микробы, при введении их в организм, не вызывали саму болезнь, но вырабатывали иммунитет.

Прививка БЦЖ входит в число обязательных в нашей стране и включена в национальный календарь профилактических прививок. Но с каждым днем количество отказов от прививок БЦЖ растет.

Так, за 5 месяцев 2022 г. в Республике Алтай родилось 1068 детей, из них 51 не получали вакцинацию против туберкулеза (10 отказов и 41 медицинских отводов). Наибольшее количество отказов регистрируется в Майминском районе 3 отказа, г.Горно-Алтайске и Чемальском районе по 2 отказа, в Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Шебалинском районах по 1 случаю.

Не получив прививку против столь грозного заболевания ребенок рискует заболеть тяжелой формой туберкулеза, которая может привести к смерти. Родители не должны отказываться от предлагаемых процедур, поскольку они помогают защитить малыша от серьезных последствий инфекционных заболеваний в 95% случаев.

Вакцина БЦЖ защищает от первичных форм туберкулеза и, особенно, от его тяжелых, распространенных и внелегочных форм (таких как менингит, поражение костей), диагностировать и лечить которые труднее всего. Если мама отказывается от прививки БЦЖ, она должна понимать, что подвергает ребенка очень высокому риску заражения туберкулезом и при этом должна быть абсолютно убеждена в отсутствии контактов ее малыша с больными. Согласно национальному календарю прививок вакцина БЦЖ применяется всем новорожденным детям на 3-7 день после их рождения.

Уважаемые родители, выберете лучшее для своего ребенка - поставьте прививку и обеспечьте здоровое будущее своему малышу!

Учитывая распространенность туберкулеза, угроза заразиться и заболеть сегодня существует для каждого. Поэтому взрослым тоже необходимо ежегодное рентгенологическое или флюорографическое обследование органов грудной клетки, своевременное обращение за медицинской помощью, даже при «незначительных» отклонениях в состоянии здоровья, а также ведение здорового образа жизни.