

В Республике Алтай по-прежнему отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, переносимых клещами. В сезоне 2022 года уже зарегистрировано 2812 случаев обращений граждан по поводу присасывания клещей (в 2021 году на это время было 3736 случаев). Напротив, заболевших клещевыми инфекциями в текущем сезоне больше, чем за этот же период в 2021 году. 70 человек заболели клещевыми инфекциями (в 2021 году – 59 человек), в том числе в этом сезоне диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 7 человек, сибирский клещевой тиф – у 49 человек, клещевой боррелиоз – у 14 человек.

Как, правило, в июле начинается подъем заболеваемости сибирским клещевым тифом, связанный с активностью нимф (неполовозрелой стадии клещей, которые выглядят как очень маленькие клещи – 1 мм). Присасывание нимф бывает кратковременным и безболезненным, но заражение при этом всё равно происходит, потому что количество патогенных риккетсий в них не уступает зараженности взрослых клещей (в некоторых районах заражены 20-33% особей).

В Республике Алтай открыт 131 пункт экстренной профилактики, где уже 1497 человек (в том числе 546 детей) получили иммуноглобулин против клещевого энцефалита (из 3736 обратившихся 520 человек были привиты КЭ). Напоминаем, что людям, застрахованным на случай присасывания клеща, при сдаче клеща для исследования в лабораторию и при получении иммуноглобулина необходимо при себе иметь договор о страховании (бумажный вариант и иммунокарту).

Организована экспресс-диагностика переносчиков, присосавшихся к людям. В этом сезоне исследовано 1428 экземпляров клещей, из которых 589 экз. (41,2%) были положительными (в том числе в 17 переносчиках выявлен вирус клещевого энцефалита, в 434 – боррелии, в 89 – анаплазмы, в 50 экземплярах клещей – эрлихии). В прошлом сезоне зараженность переносчиков была выше – 45,4% (из 1461 экземпляра патогены были выявлены в 674 особях).

Действенными мерами защиты населения от клещей являются акарицидные обработки мест массового посещения, объемы которых в республике ежегодно увеличиваются: так, в 2015 году было обработано 506 га, в 2016 году – 520 га, в 2017 году – 681 га, в 2018 – 691 га, в 2019 году – 695 га, в 2020 – 703 га, в 2021 – 727 га, на текущую дату обработано 745 га. Сейчас, в связи с активностью нимфальной стадии клещей, необходимы повторные противоклещевые обработки мест массового посещения и

туристических объектов. Очень важно также в июле и августе проводить акарицидные обработки скота, особенно в горно-степных районах, где преобладают клещи рода Дермацентор (Чемальский, Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский).

Однако главным принципом защиты каждого человека является обработка одежды в июле и августе (когда клещей будет много) противоклещевыми аэрозолями («ДЭТА», «Гардекс», «Пикник»), к которым, кстати, нимфы очень чувствительны.

