

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай уже не раз предупреждали, что активность клещей в нашем регионе продолжается до конца октября. Сейчас, в пору заготовки сена, клещей много! Правда, в основном это - не взрослые клещи, а их дети – нимфы (маленькие клещи размером 1-2 мм). Впрочем, появились также уже взрослые клещи рода Дермацентор (это их второе поколение за сезон).

За час работы наши специалисты в окрестностях Горно-Алтайска и Маймы набрали 10 взрослых клещей рода Дермацентор. Это клещи, которые являются переносчиками сибирского клещевого тифа (и, в меньшей степени, клещевого энцефалита и других опасных инфекций).



Охота на клещей: клещи цепляются на флаг

Клещи рода Дермацентор любят открытые пространства. Встретить этих клещей можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных дорог. Кратковременный и

безболезненный укус клещей рода Дермацентор бывает часто незаметен для человека (особенно когда присасываются ненадолго нимфы). Особенно неблагоприятными районами по сибирскому клещевому тифу являются Онгудайский, Улаганский, Усть-Коксинский и Кош-Агачский, где регистрируется от 30 до 70 больных за сезон. Но и остальные районы тоже являются эндемичными по сибирскому клещевому тифу.



Клещ рода Дермацентор (взрослая особь), 18.08.2018.

Люди заражаются при сельскохозяйственных работах: пастьба скота, сенокос, сбор трав (ягод, грибов). Дети – при общении с собаками и кошками. Увы, но клещи будут до снега, а это значит, надо пользоваться аэрозолями против клещей практически постоянно! А также обрабатывать скот, собак, кошек против клещей. У жителей республики очень высока вероятность заболеть клещевым риккетсиозом или, как его еще называют, сибирским клещевым тифом, потому что возбудитель находится в каждом 3-5 клеще!


Какие симптомы бывают при сибирском клещевом тифе?

При клещевом сыпном тифе люди заболевают через 1-6 суток после укуса клеща. На месте присасывания клеща формируется небольшой очаг воспаления с темной корочкой посередине.



Место присасывания клеща

Заболевание сопровождается высокой температурой, слабостью и появлением характерной сыпи (отсюда и еще одно название болезни – *клещевой **сыпной** тиф*). Заболевание протекает обычно легче, чем клещевой энцефалит и поддается лечению антибиотиками.



Сыпь при сибирском клещевом тифе

Врачи в последние годы наблюдают утяжеление клинического течения болезни, вплоть до развития комы. Возможно, эти случаи связаны со множественными присасываниями нимф клещей или с попаданием в организм человека нескольких возбудителей. Поэтому надо беречься самим и беречь детей!

Давайте вспомним еще раз о профилактике...

Не выходите на дачу, в огород, на природу, на работу в поле или приусадебный участок в необработанной против клещей **обуви и одежде**. Покупая противоклещевые препараты («Гардекс», «ДЭТА»), обращайтесь на срок годности. Ежедневно осматривайте себя и своих детей. Помните, что занести клещей в дом (квартиру) могут домашние животные – кошки и собаки. Снимайте клещей в перчатках! Не раздавливайте клещей – это опасно.

При обнаружении клеща немедленно обращайтесь к медикам! Именно в медицинских организациях вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита и назначается профилактическое лечение антибиотиками против остальных болезней, которые передаются клещами. Своевременно проведенная профилактика предотвращает заболевание!

И ещё – в период сезона надо пить только кипяченое молоко, так как есть вероятность заразиться клещевыми инфекциями через сырое молоко коз и коров, которых покусали зараженные клещи.