

06 сентября 2018 года в Министерстве здравоохранения Республики Алтай состоялось заседание Координационного совета по проблеме ВИЧ/СПИД в Республике Алтай. В совещании приняли участие сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Центра по профилактике и борьбе со СПИД, Министерства труда и социального развития, Министерства внутренних дел, лечебно-профилактических организаций.

На совещании отмечено, что с момента регистрации в стране проживало более 978 443 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 293 960 умерших больных. С 2005 по 2017 г. в стране регистрировался ежегодный рост количества новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ. В Республике Алтай с 2009 г. также наблюдается ежегодный рост количества новых выявленных случаев. Так, в 2017 г. рост составил 17,7% по сравнению с предыдущим годом.

Высокие показатели заболеваемости с превышением республиканских сохраняются в Майминском, Турочакском, г.Горно-Алтайск, Усть-Коксинском и Чойском районах (в Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2018 года общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1 272 403 человека, пораженность ВИЧ-инфекцией составила 666,1 на 100 тыс.населения России). В 2018 г. по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: Кемеровская область (зарегистрировано 101,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс.населения), Новосибирская (77,3), Иркутская (76,0), Томская (66,4), Алтайский край (53,2), Омская область (47,9), Республика Хакасия (46,3). Учитывая неблагоприятную обстановку по ВИЧ-инфекции как в Российской Федерации, так и близлежащих, соседних территориях, прогноз развития эпидемии ВИЧ в Республике Алтай - неблагоприятный.

В Республике Алтай эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 01.09.2018 года достигло 921 человек. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Республики Алтай составил 424,4 на 100 тыс. населения.

Наибольший уровень пораженности населения наблюдается в возрастной группе 20-29 лет, что составляет 35,9% и 30-39 лет, что составляет 36,6%, в возрасте от 15 до 19 лет 3,6% были инфицированы ВИЧ. Таким образом, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.

В последнее время особенностью эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции является преобладание полового пути передачи с вовлечением в эпидемиологический процесс лиц трудоспособного возраста 30-50 лет из социально адаптированных слоев населения. Причиной роста количества ВИЧ-инфицированных среди лиц среднего возраста является отсутствие интереса у этих слоев населения к проблеме ВИЧ. Для большинства людей 30-50 лет ВИЧ-инфекция утратила статус смертельно опасного заболевания и осталась «болезнью, которая нас не касается, ведь мы – не из группы риска».

По итогам обсуждения ситуации по заболеваемости ВИЧ/СПИД, в целях обеспечения охраны здоровья населения, повышения эффективности принимаемых мер, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в регионе, формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни среди населения, участники совещания приняли решение, куда по указанному вопросу включен широкий перечень профилактических мероприятий.