

В 2017 году в мире значительно обострилась эпидемиологическая ситуация по ряду опасных инфекционных болезней. По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Зимбабве зарегистрирована крупнейшая вспышка малярии, возникшая вследствие затяжных проливных дождей, вызванных тропическим циклоном. За последние 2 месяца зарегистрировано около 90 тыс. новых случаев, из которых более 200 закончились летальным исходом. Также в африканском регионе отмечается рост заболеваемости холерой среди местного населения.

В ряде стран Европы продолжают регистрироваться случаи заболевания корью (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Польша, Румыния). Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Румынии, где заболело более 3,4 тыс. человек, в результате вспышки кори умерло 17 человек, все они не были привиты против этой инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращает внимание граждан, планирующих выезд в вышеуказанные страны, о возможном риске заражения и необходимости соблюдения мер личной профилактики.

В случае ухудшения состояния здоровья после возвращения из перечисленных стран следует обратиться к врачу, сообщив ему о стране Вашего пребывания.

### **Справочно:**

**Малярия** — паразитарная болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Путь передачи возбудителя — через укусы комаров. Инкубационный период развития составляет от 3 до 7 дней. Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль). Характерным признаком малярии является периодически повторяющиеся приступы лихорадки. Основная мера профилактики — недопущение укусов комаров (использование репеллентов, ношение одежды светлых тонов с длинными рукавами и брюк). Следует избегать заболоченных мест, не открывать в гостиницах окна, если они не оборудованы москитными сетками, использовать кондиционер.

**Холера** — инфекционное заболевание, клинически протекающее по типу кишечной инфекции (диарея, рвота), быстро приводящее к тяжелому обезвоживанию. При отсутствии надлежащего лечения заболевание приводит к летальному исходу. Заражение происходит при употреблении воды, пищи, зараженной возбудителем холеры. Мерами профилактики являются строгое соблюдение правил личной гигиены, употребление воды гарантированного качества и тщательно обработанных овощей и фруктов, а также пищевой продукции после тепловой обработки.

**Корь** — высококонтагиозное (чрезвычайно заразное) острое вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Инкубационный период составляет от 7 до 17 дней. Клинические проявления заболевания — повышение температуры до 38-39°С, насморк, чихание, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь, сыпь. Единственной мерой профилактики кори является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации прививки против кори проводятся детям (12 месяцев, 6 лет) и взрослым до 55 лет (ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори, однократно привитым).